



Zielona Góra, 28 grudnia 2022r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ZIELONEJ GÓRZE

# **KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM OGNISK WYSOCE ZJADLIWEJ PTASIEJ GRYPY NA TERENIE POLSKI W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM**

W związku z wystąpieniem pierwszych ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie Polski w sezonie jesienno-zimowym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o konieczności wzmocnienia nadzoru i bezwzględnie przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. ( Dz.U. poz. 768) w *sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków*.

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy u drobiu w sezonie jesienno-zimowym na terenie Polski stwierdzono w dniu 7 grudnia 2022 r. na terenie województwa opolskiego. Do dnia 27 grudnia 2022 stwierdzono wystąpienie następnych 19 ognisk między innymi na terenie województwa wielkopolskiego.

### **Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:**

1. Utrzymywać drób w sposób wykluczający ich dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, bezwzględnie przestrzegać zakazu pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą z takich zbiorników ( w tym z wód powierzchniowych – kałuż, jezior, stawów, rzek, potoków i kanałów rzecznych);
2. Utrzymywać drób ( z wyłączeniem kaczek i gęsi) w izolacji od dzikich ptaków, w przypadku wątpliwości co do możliwości zabezpieczenia drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami należy rozważyć utrzymywanie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu;
3. Przechowywać paszę i ściólkę dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściólkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami ;
4. Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka wyłącznie w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym w sposób który zabezpieczy paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
5. Lokalizować gniazda wewnątrz budynków;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra

tel.: (68)453-73-24, e-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl, db



6. Osoby które uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne w ciągu ostatnich 48 godzin bezwzględnie nie mogą wykonywać czynności związanych z utrzymaniem drobiu, nie wolno też wносить na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób , zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
7. Należy dokonywać codziennego przeglądu stada a w przypadku stwierdzenia objawów nasuwających podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy u ptaków bezzwłocznie zgłaszać to do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej ( gabinet, lecznica, klinika weterynaryjna). Objawy na które należy zwrócić uwagę to:
  - zwiększona śmiertelność ptaków,
  - spadek pobierania paszy i wody,
  - objawy nerwowe takie jak : drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów,
  - duszność
  - sinica i wybroczynowość,
  - biegunki ,
  - nagły spadek nieśności.

Wysoce zjadliwa ptasia grypa jest niezwykle zakaźną i zaraźliwą chorobą drobiu, która może spowodować śmiertelność w stadzie nawet 100%. Jest to choroba wirusowa i źródłem zakażenia są chore ptaki, które wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z kałem, wydzieliną z oczu, wydzieliną z dróg oddechowych i wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Takie gatunki drobiu jak kury i indyki są bardzo wrażliwe na zakażenie i wystąpienie u nich objawów choroby, natomiast kaczki i gęsi są wrażliwe na zakażenie ale bardzo rzadko występują u nich objawy kliniczne choroby – są więc one bardzo często źródłem zakażenia dla innych ptaków mimo, że same nie chorują.

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby stąd tak niezwykle ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji aby do minimum ograniczyć roznoszenie wirusa pomiędzy gospodarstwami.

Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Zielonej Górze

lek. wet. Anna Starosta

---

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra

tel.: (68)453-73-24, zielonagora.piw@wet.zgora.pl, db

